

# Inégalités - Seconde

©Pascal Brachet (CC BY NC SA)

<https://www.xm1math.net>

# 1. Ordre sur $\mathbb{R}$

## Définition

Pour tous réels  $x$  et  $y$ , dire que  $x$  est **inférieur ou égal à**  $y$  signifie que  $(y - x)$  est positif.

Notation :  $x \leq y$ .

## Remarque(s)

- On dit que  $x$  est **strictement inférieur à**  $y$  lorsque  $(y - x)$  est strictement positif.  
Notation :  $x < y$
- Si  $x \leq y$  et  $y \leq z$  alors on a  $x \leq z$ .
- Si  $x \leq y$  et  $y \leq x$  alors on a  $x = y$ .
- Si  $a \leq x$  et  $x \leq b$  alors on peut écrire que  $a \leq x \leq b$   
(on dit qu'on a un encadrement de  $x$ ).

## 2. Opérations sur les inégalités

### Règle 1

Si on ajoute, ou retranche, un même réel aux deux membres d'une inégalité, on obtient une inégalité de même sens :  $x \leq y \Leftrightarrow x + a \leq y + a$

### Exemple(s)

$$1) x \leq 4 \stackrel{+2}{\Leftrightarrow} x + 2 \leq 4 + 2 \Leftrightarrow x + 2 \leq 6$$

$$2) x \leq -5 \stackrel{-4}{\Leftrightarrow} x - 4 \leq -5 - 4 \Leftrightarrow x - 4 \leq -9$$

$$3) x - 3 \leq 7 \stackrel{+3}{\Leftrightarrow} x \leq 7 + 3 \Leftrightarrow x \leq 10$$

$$4) x + 6 \leq 1 \stackrel{-6}{\Leftrightarrow} x \leq 1 - 6 \Leftrightarrow x \leq -5$$

## 2. Opérations sur les inégalités

### Règle 2

Si on ajoute membre à membre deux inégalités de même sens on obtient une inégalité de même sens : Si  $x \leq y$  et  $x' \leq y'$  alors  $x + x' \leq y + y'$

### Exemple(s)

- 1) Si  $x \leq -1$  et  $x' \leq \frac{1}{2}$  alors  $x + x' \leq -1 + \frac{1}{2}$ . Ce qui donne  $x + x' \leq -\frac{1}{2}$ .
- 2) Si  $\frac{3}{4} \leq x$  et  $-2 \leq x'$  alors  $\frac{3}{4} - 2 \leq x + x'$ . Ce qui donne  $-\frac{5}{4} \leq x + x'$ .

### Attention !

Ne jamais soustraire membre à membre deux inégalités.

(contre-exemple : on a bien  $5 \leq 7$  et  $4 \leq 9$  mais  $(5 - 4)$  n'est pas inférieur à  $(7 - 9)$  )

## 2. Opérations sur les inégalités

### Règle 3

Si on multiplie, ou divise, par un même réel **strictement positif** les deux membres d'une inégalité, on obtient une inégalité de **même sens** : Pour tout  $k > 0$ ,  $x \leq y \Leftrightarrow kx \leq ky$

### Exemple(s)

$$1) x \leq 2 \stackrel{\times 2}{\Leftrightarrow} 2x \leq 2 \times 2 \Leftrightarrow 2x \leq 4$$

$$2) x \leq -3 \stackrel{\times \frac{2}{3}}{\Leftrightarrow} \frac{2}{3}x \leq \frac{2}{3} \times (-3) \Leftrightarrow \frac{2}{3}x \leq -2$$

$$3) \frac{7}{2} \leq x \stackrel{\times 8}{\Leftrightarrow} 8 \times \frac{7}{2} \leq 8x \Leftrightarrow 28 \leq 8x$$

$$4) 3x \leq -6 \stackrel{\times \frac{1}{3}}{\Leftrightarrow} x \leq \frac{1}{3} \times (-6) \Leftrightarrow x \leq -2$$

$$5) \frac{3}{4}x \leq 6 \stackrel{\times \frac{4}{3}}{\Leftrightarrow} x \leq \frac{4}{3} \times 6 \Leftrightarrow x \leq 8$$

$$6) \sqrt{3}x \leq -2 \stackrel{\times \frac{1}{\sqrt{3}}}{\Leftrightarrow} x \leq \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

## 2. Opérations sur les inégalités

### Règle 4

Si on multiplie, ou divise, par un même réel **strictement négatif** les deux membres d'une inégalité, on obtient une inégalité de **sens contraire** : Pour tout  $k < 0$ ,  $x \leq y \Leftrightarrow kx \geq ky$

### Exemple(s)

$$1) x \leq 5 \stackrel{\times(-3)}{\Leftrightarrow} -3x \geq -3 \times 5 \Leftrightarrow -3x \geq -15$$

$$2) x \leq -\frac{8}{3} \stackrel{\times\left(-\frac{3}{4}\right)}{\Leftrightarrow} -\frac{3}{4}x \geq -\frac{3}{4} \times \left(-\frac{8}{3}\right) \Leftrightarrow -\frac{3}{4}x \geq 2$$

$$3) x \leq 3\sqrt{2} \stackrel{\times\left(-\frac{1}{2}\right)}{\Leftrightarrow} -x \geq -3\sqrt{2}$$

$$4) -2x \leq 6 \stackrel{\times(-1)}{\Leftrightarrow} x \geq -\frac{1}{2} \times 6 \Leftrightarrow x \geq -3$$

$$5) -x \geq \frac{2}{3} \stackrel{\times\left(-\frac{8}{9}\right)}{\Leftrightarrow} x \leq -\frac{2}{3}$$

$$6) -\frac{9}{8}x \leq 18 \stackrel{\times(-\frac{8}{9})}{\Leftrightarrow} x \geq -\frac{8}{9} \times 18 \Leftrightarrow x \geq -16$$

## 2. Opérations sur les inégalités

### Règle 5

Pour tous réels  $x$  et  $y$  **strictement positifs** :

$$\text{Si } x \leq y \text{ alors } \begin{cases} x^2 \leq y^2 \text{ (même sens)} \\ \sqrt{x} \leq \sqrt{y} \text{ (même sens)} \\ \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \text{ (sens contraire)} \end{cases}$$

### Exemple(s)

$$1) \text{ Si } 0 < x \leq 2 \text{ alors } x^2 \leq 4 ; \sqrt{x} \leq \sqrt{2} \text{ et } \frac{1}{x} \geq \frac{1}{2}$$

$$2) \text{ Si } x \geq \frac{3}{4} \text{ alors } x^2 \geq \frac{9}{16} ; \sqrt{x} \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \frac{1}{x} \leq \frac{4}{3}$$

### 3. Opérations sur les encadrements

#### Règle 6

On peut toujours ajouter membre à membre un encadrement :

$$\text{Si } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ a' \leq y \leq b' \end{cases} \text{ alors } a + a' \leq x + y \leq b + b'$$

#### Exemple(s)

$$\text{Si } \begin{cases} -1 \leq x \leq 3 \\ 5 \leq y \leq 9 \end{cases} \text{ alors } -1 + 5 \leq x + y \leq 3 + 9. \text{ Ce qui donne } 4 \leq x + y \leq 12$$

#### Règle 7

Si tous les nombres sont **positifs**, on peut multiplier membre à membre un encadrement :

$$\text{Si } a \text{ et } a' \text{ sont positifs et si } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ a' \leq y \leq b' \end{cases} \text{ alors } aa' \leq xy \leq bb'$$

#### Exemple(s)

$$\text{Si } \begin{cases} 1 \leq x \leq \frac{3}{2} \\ \sqrt{2} \leq y \leq 4 \end{cases} \text{ alors } 1 \times \sqrt{2} \leq xy \leq \frac{3}{2} \times 4. \text{ Ce qui donne } \sqrt{2} \leq xy \leq 6.$$

### 3. Opérations sur les encadrements

#### Règle 8

- Si  $k > 0$  et si  $a \leq x \leq b$  alors  $ka \leq kx \leq kb$  (bornes dans le même ordre)
- Si  $k < 0$  et si  $a \leq x \leq b$  alors  $kb \leq kx \leq ka$  (bornes dans l'ordre contraire)
- Encadrement de l'opposé : Si  $a \leq x \leq b$  alors  $-b \leq -x \leq -a$  (bornes dans l'ordre contraire)

#### Exemple(s)

Si  $-6 \leq x \leq 2$  alors  $-2 \leq -x \leq 6$

#### Règle 9

Pour tous réels  $a$ ,  $x$  et  $b$  **strictement positifs** :

Si  $a \leq x \leq b$  alors  $\begin{cases} a^2 \leq x^2 \leq b^2 \text{ (bornes dans le même ordre)} \\ \sqrt{a} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{b} \text{ (bornes dans le même ordre)} \\ \frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a} \text{ (bornes dans l'ordre contraire)} \end{cases}$





#### Exemple(s)

Si  $2 \leq x \leq 5$  alors  $4 \leq x^2 \leq 25$  ;  $\sqrt{2} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{5}$  et  $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$

#### Remarque(s)

Attention ! : Ne jamais soustraire ou diviser membre à membre deux encadrements.

## 4. Les intervalles de $\mathbb{R}$

Intervalle	Définition	Schéma sur la droite des réels
$[a ; b]$	tous les $x$ tels que $a \leq x \leq b$	
$]a ; b[$	tous les $x$ tels que $a < x < b$	
$[a ; b[$	tous les $x$ tels que $a \leq x < b$	
$]a ; b]$	tous les $x$ tels que $a < x \leq b$	
$[a ; +\infty[$	tous les $x$ tels que $x \geq a$	
$]a ; +\infty[$	tous les $x$ tels que $x > a$	
$]-\infty ; a]$	tous les $x$ tels que $x \leq a$	
$]-\infty ; a[$	tous les $x$ tels que $x < a$	

si le 1<sup>er</sup> crochet est [ la borne inférieure de l'intervalle est dite fermée, sinon elle est dite ouverte.

si le 2<sup>e</sup> crochet est ] la borne supérieure de l'intervalle est dite fermée, sinon elle est dite ouverte.

## 5. Notions de base sur les ensembles

### a) Appartenance

#### Définition

Étant donné un ensemble  $A$ , dire qu'un élément  $x$  appartient à  $A$  s'écrit  $x \in A$  et dire que  $x$  n'appartient pas à  $A$  s'écrit  $x \notin A$ .

#### Exemple(s)

$1 \in [0 ; 4]$  et  $-2 \notin [0 ; +\infty[$

### b) Inclusion

#### Définition

Si tout élément d'un ensemble  $A$  est aussi élément d'un ensemble  $B$ , on dit que  $A$  est **inclus** dans  $B$  et on écrit que  $A \subset B$ .

#### Exemple(s)

$[0 ; 1] \subset [-2 ; 4]$  car tout réel de  $[0 ; 1]$  est aussi dans  $[-2 ; 4]$ .

## 5. Notions de base sur les ensembles

### c) Intersection de deux ensembles

#### Définition

Étant donné deux ensembles  $A$  et  $B$ , on appelle **intersection** de  $A$  et  $B$ , l'ensemble des éléments appartenant à  $A$  **ET** à  $B$ .

L'intersection de  $A$  et  $B$  se note  $A \cap B$  (*« A inter B » oralement*)

#### Exemple(s)

Pour déterminer l'intersection de deux intervalles, on peut utiliser un schéma avec une couleur différente pour chaque intervalle. L'intersection est composée alors des nombres appartenant aux zones où figurent les deux couleurs en même temps.

$[1 ; 4] \cap [2 ; 5] = [2 ; 4]$	
$[-3 ; +\infty[ \cap ]1 ; 2[ = ]1 ; 2[$	
$] -1 ; 4] \cap ] -\infty ; 3[ = ] -1 ; 3[$	
$[-2 ; 1] \cap [3 ; +\infty[ = \emptyset$	

## 5. Notions de base sur les ensembles

### d) Réunion de deux ensembles




#### Définition

Étant donné deux ensembles  $A$  et  $B$ , on appelle **réunion** de  $A$  et  $B$ , l'ensemble des éléments appartenant à  $A$  **OU** à  $B$ .

La réunion de  $A$  et  $B$  se note  $A \cup B$  (*« A union B » oralement*)

#### Exemple(s)

Pour déterminer l'union de deux intervalles, on peut utiliser un schéma avec une couleur différente pour chaque intervalle. L'union est composée alors des nombres appartenant aux zones où figurent au moins une couleur.

$]-1 ; 4] \cup [2 ; 5[ = ]-1 ; 5[$	
$[-4 ; +\infty[ \cup ]-5 ; 1[ = ]-5 ; +\infty[$	
$]-6 ; 2[ \cup ]-5 ; 5[ = ]-6 ; 5[$	
$]-\infty ; 1[ \cup ]0 ; +\infty[ = \mathbb{R}$	
$]-\infty ; 3[ \cup ]-\infty ; 1] = ]-\infty ; 3[$	

## 6. Méthodes de comparaison de deux expressions

- Comparer deux expressions  $A(x)$  et  $B(x)$  (dépendantes d'une variable  $x$ ), c'est déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles on a  $A(x) < B(x)$  et celles pour lesquelles on a  $A(x) > B(x)$ .
- Il est quelquefois plus simple de chercher le signe de la différence  $A(x) - B(x)$  plutôt que de procéder avec des inégalités. On se base alors sur le principe suivant :
  - Si  $A(x) - B(x)$  est strictement négatif, c'est que  $A(x) < B(x)$ .
  - Si  $A(x) - B(x)$  est strictement positif, c'est que  $A(x) > B(x)$ .
- Une autre méthode possible si on est sûr que  $A(x)$  et  $B(x)$  sont strictement positifs est de comparer le quotient  $\frac{A(x)}{B(x)}$  à 1 en se basant sur le principe suivant :
  - Si  $\frac{A(x)}{B(x)}$  est strictement inférieur à 1, c'est que  $A(x) < B(x)$ .
  - Si  $\frac{A(x)}{B(x)}$  est strictement supérieur à 1, c'est que  $A(x) > B(x)$ .

Fin du chapitre