

# Compléments sur l'exponentielle

©Pascal Brachet (CC BY NC SA)

<https://www.xm1math.net>

## 1. Rappels sur les propriétés d'un exponentiel

### Propriété(s)

- $e^0 = 1$
- *Un exponentiel est toujours strictement positif*
- $e^a \times e^b = e^{a+b}$
- $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$
- $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
- *Pour tout entier  $n$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$*

Ainsi, pour tout  $x$  on a :  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$  ;  $(e^x)^2 = e^{2x}$  ;  $(e^x)^3 = e^{3x}$  ...

### ► Exemples :

- $e^2 \times e^3 = e^{2+3} = e^5$
- $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5$
- $\frac{(e^x)^2}{e^{3x}} = \frac{e^{2x}}{e^{3x}} = e^{2x-3x} = e^{-x}$
- $\frac{e^{5x} \times e^{-2x}}{(e^x)^2} = \frac{e^{5x-2x}}{e^{2x}} = \frac{e^{3x}}{e^{2x}} = e^{3x-2x} = e^x$

## 2. La fonction exponentielle

Elle est définie sur  $\mathbb{R}$ .

### a) Limites

Propriété(s)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

### b) Dérivée et sens de variation

Propriété(s)

$$\text{Pour tout } x, (e^x)' = e^x$$

► *Conséquence* : comme un exponentiel est toujours strictement positif, la dérivée de l'exponentielle prend des valeurs toujours strictement positives. La fonction exponentielle est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$e^x$	$0$	$+\infty$

↗

### c) Convexité

Pour tout  $x$ ,  $(e^x)''(x) = e^x > 0$ . Donc la fonction exponentielle est convexe sur  $\mathbb{R}$ .



xmlmath.net

## 3. Équations $e^x = e^a$ et inéquations

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , on a :

Propriété(s)

- $e^x = e^a \Leftrightarrow x = a$
- $e^x > e^a \Leftrightarrow x > a$
- $e^x < e^a \Leftrightarrow x < a$
- $e^x \leq e^a \Leftrightarrow x \leq a$
- $e^x \geq e^a \Leftrightarrow x \geq a$

► *Exemples* :

- $e^{2x} = e^4 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$
- $e^{3x+6} = 1 \Leftrightarrow e^{3x+6} = e^0 \Leftrightarrow 3x+6 = 0 \Leftrightarrow x = -2$
- $e^{(x^2)} = e^4 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$  ou  $x = -2$
- $e^{2x} < 1 \Leftrightarrow e^{2x} < e^0 \Leftrightarrow 2x < 0 \Leftrightarrow x < 0$
- $e^{1-x} \geq e^2 \Leftrightarrow 1-x \geq 2 \Leftrightarrow 1-x \geq 2 \Leftrightarrow -1 \geq x$

xmlmath.net

## 4. Fonctions de la forme $e^u$

### a) Dérivée de $e^u$

#### Propriété(s)

Si  $u$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  alors  $e^u$  est aussi dérivable sur  $I$  et on a  $(e^u)' = u' e^u$

#### ► Exemples :

- Si  $f(x) = e^{4x}$  alors  $f'(x) = \underbrace{4}_{\text{dérivée de } 4x} \times e^{4x}$ .
- Si  $f(x) = e^{x^2+3x}$  alors  $f'(x) = \underbrace{(2x+3)}_{\text{dérivée de } x^2+3x} \times e^{x^2+3x}$ .
- Si  $f(x) = e^x$  alors  $f'(x) = \underbrace{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}_{\text{dérivée de } \frac{1}{x}} \times e^x$ .

### b) Limites de $e^u$

#### ► Exemples :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e(x^2) = +\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = 1$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1$ .


## 5. Introduction au logarithme népérien

### a) Antécédent d'un réel $b$ par la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : Pour tout réel  $b$  strictement positif, il existe un unique réel  $a$  tel que  $e^a = b$ .

Ce nombre est appelé **logarithme népérien** de  $b$  et est noté  $\ln b$ .

Ainsi, on a l'équivalence fondamentale :  $e^a = b \Leftrightarrow a = \ln b$



### b) Conséquences

- $e^0 = 1 \Leftrightarrow 0 = \ln 1$
- $e^1 = e \Leftrightarrow 1 = \ln e$
- $e^x = e^x \Leftrightarrow x = \ln(e^x)$
- $\ln x = \ln x \Leftrightarrow e^{\ln x} = x$

#### Propriété(s)

- $\ln x$  n'existe que si  $x > 0$
- $\ln 1 = 0$
- $\ln(e^x) = x$
- $\ln e = 1$
- $e^{\ln x} = x$

#### ► Exemples :

- $e^{\ln 4} = 4$
- $e^{\ln 2 + \ln 3} = e^{\ln 2} \times e^{\ln 3} = 2 \times 3 = 6$
- $e^{-\ln 2} = \frac{1}{e^{\ln 2}} = \frac{1}{2}$
- $e^{\ln 2 - \ln 3} = \frac{e^{\ln 2}}{e^{\ln 3}} = \frac{2}{3}$


## 6. Équations $e^x = b$ et inéquations

### Propriété(s)

$$e^x = b \Leftrightarrow x = \ln b \quad (\text{si } b > 0)$$

### ► Exemples :

- $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$
- $e^x = -1$  est impossible
- $e^{x+2} = 3 \Leftrightarrow x + 2 = \ln 3 \Leftrightarrow x = -2 + \ln 3$
- $e^{2x} - 5 = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = 5 \Leftrightarrow 2x = \ln 5 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln 5$   
(il faut d'abord isoler l'exponentiel avant d'utiliser l'équivalence)
- $e^{-0,1x} = 0,7 \Leftrightarrow -0,1x = \ln 0,7 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 0,7}{-0,1}$



## 6. Équations $e^x = b$ et inéquations


### Propriété(s)

si  $b > 0$  :

- $e^x > b \Leftrightarrow x > \ln b$
- $e^x \geq b \Leftrightarrow x \geq \ln b$
- $e^x < b \Leftrightarrow x < \ln b$
- $e^x \leq b \Leftrightarrow x \leq \ln b$

### ► Exemples :

- $e^x \leq 5 \Leftrightarrow x \leq \ln 5$
- $e^{-2x} > 3 \Leftrightarrow -2x > \ln 3 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \ln 3$
- $4 - e^x \leq 0 \Leftrightarrow 4 \leq e^x \Leftrightarrow \ln 4 \leq x$
- $e^{-0,1x} < 0,5 \Leftrightarrow -0,1x < \ln 0,5 \Leftrightarrow x > -\frac{\ln 0,5}{0,1}$



# Fin du chapitre

